SUIVI HIVERNAL DES OISEAUX COMMUNS (SHOC)

BILAN de la saison hivernale 2025-2026 pour le département d'Eure et Loir



@ photo de Michel Brugière

Coordinateur départemental : Jean Luc ROUSSEAU

Contexte

Le programme SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs) est un programme protocolé assez récent qui a été lancé durant l'hiver 2014/2015 et qui a fait suite au suivi hivernal des oiseaux des champs, réalisé en milieu agricole entre 2006 et 2013. C'est le « pendant » hivernal du programme STOC. Il est également coordonné au niveau national conjointement par la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle et vise sur le long terme à établir une vision précise de l'évolution annuelle et spatiale (indice d'abondance relative) des populations hivernantes d'oiseaux communs sur le territoire national et de mieux appréhender le statut de certaines de ces espèces ainsi que leurs déplacements temporels souvent en lien avec les ressources alimentaires, les habitats fréquentés, les conditions météorologiques et de déterminer l'impact du phénomène de réchauffement climatique.

Celui-ci fait aussi l'objet d'une relance régionale et départementale dans le cadre de la coordination mise en place par France Nature Environnement (FNE) souhaitant également relancer sur son territoire régional cette enquête au même titre que ce qui a été réalisé pour le programme STOC.

Protocole

Le programme SHOC, qui s'inscrit lui aussi dans un suivi ornithologique annuel sur le long terme, est intégralement réalisé par les ornithologues participants déjà au programme STOC. En effet, il nécessite de savoir reconnaitre les oiseaux à vue et à l'écoute via les différentes émissions vocales hivernales (cris de contact, cris en vol, cri d'alarme et cris divers…) et est réalisé sur les carrés de 2 km sur 2 déjà suivis pour le STOC.

Le relevé ornithologique est enregistré à raison d'un passage sur le mois de décembre, et d'un second sur le mois de janvier, les 2 passages devant être séparés par au minimum 2 semaines d'intervalles. Le comptage matinal doit être réalisé, de préférence, tous les ans aux mêmes dates ou à quelques jours d'intervalle, autant que la météo et les conditions d'observation puissent le permettre. Le parcours à suivre est constitué d'une série de 10 transects de 300 mètres disposés bout à bout sur l'ensemble des différents habitats représentés sur le carré de suivi et parcourus dans le même ordre d'une année sur l'autre.

Situation en Eure et Loir

Pour notre quatrième participation à la saison du programme SHOC, un carré supplémentaire de suivi hivernal (en vert dans le tableau ci-dessous) est venu s'ajouter au 8 carrés de suivis existants. Tous ces relevés SHOC sont situés sur les même carrés que ceux utilisés pour le STOC et par les mêmes naturalistes de terrain.

Tableau 1 - Liste des ornithologues et des carrés suivis sur l'hiver 2025/2026

Nom	Prénom	Communes du SHOC	Réf carré
Bascio	*Benoit*	*Pré Saint Evroult / Bullainville*	*281195*
Beaudoin	Cédric	Brunelles / Champrond en P	280825
Bertheau	*Alexandre*	*Neuvy en Beauce*	*280950*
Landier	*Bruno*	*Charray / Romilly sur Aigre*	*281484*
Launay	*Dominique*	*Saint Victor de Buthon*	*280622*
Martins	Josepha	Prudemanche / Crucey	280132
Martins	Josepha	Les Chatelets / La Saucelle	280214
Robinet	*Sabine*	*Meslay le Grenet / Sandarville*	*280753*
Rousseau	Jean Luc	Montboissier / Moriers	281065

Tableau 1 – En italique les participants de l'OFB

Caractéristique des carrés

- Localisation

La plaine de Beauce est la plus représentée avec 5 carrés de suivis, tous situés sur sa partie sud et est du département. Viens ensuite le Thymerais avec ses 2 carrés respectifs et le Perche avec les 2 carrés restants. Ce programme de suivi hivernal étant très récent, il ne permet pas encore une bonne représentativité des régions naturelles présentes sur notre département.

- Type de milieux

Il n'y a pas en Eure et Loir, dans le cadre de ce programme, de parcours SHOC réalisé seul, sans que celui-ci ne soit pas en lien avec un carré déjà utilisé pour le programme STOC. Il s'agit bien des mêmes milieux que ceux suivis durant la saison de reproduction sur lesdits carrés.

Le milieu agricole reste le biotope le mieux représenté sur les carrés du suivi SHOC, loin devant le milieu anthropique et le milieu forestier. Le nombre encore faible de carré STOC réalisé en hiver, ne permet pas encore de couvrir l'ensemble des milieux naturels présents sur notre département.

Figure 1 Représentation des différents milieux présents sur l'ensemble des carrés suivis



Résultats

- Suivi hivernal 2025 – 2026

Le protocole du programme SHOC est basé sur 2 comptages matinaux, réalisés entre 08h et 13h en l'absence de vent fort et/ou de pluie forte pour ne pas pénaliser le relevé. Le premier est à effectuer entre le 1er et le 31 décembre, le second passage entre le 1er et le 31 janvier avec un minimum de 15 jours d'écart entre les 2 relevés. Chaque observateur enregistre ainsi tous les oiseaux vus et/ou entendus sur les 3 km de parcours décomposé en 10 transects de 300 mètres chacun, en prenant soin de ne pas comptabiliser 2 fois les mêmes oiseaux notamment ceux en déplacement vers les transects suivants.

Sur les carrés d'Eure et Loir suivis, le 1er passage a été réalisé entre le 2 et le 24 décembre 2025. Le second passage a été réalisé entre le 4 et le 29 janvier 2026. La restitution des données est ensuite

enregistrée via le module SHOC dédié sur les comptes respectifs de chacun des participants depuis le site national Faune France.

Tableau 2 - Dates de passage et nb d'oiseaux observés par carré

N° Carrés	Communes	Dates de passage		Nb espèces observés	Nb individus observés
		Décembre	Janvier		
280132	Prudemanche	16-déc	19-janv	21	145
280214	Les Châtelets	17-déc	20-janv	26	211
280622	St Victor de Buthon	02-déc	19-janv	24	315
280753	Meslay le Grenet	11-déc	13-janv	26	1229
280825	Brunelles	09-déc	04-janv	41	920
280950	Neuvy en Beauce	12-déc	23-janv	28	14084
281065	Montboissier	06-déc	29-janv	36	1949
281195	Pré Saint Evroult	24-déc	23-janv	8	228
281484	Charray	10-déc	08-janv	25	538

- Espèces observées

Sur l'ensemble des carrés de suivi SHOC, 62 espèces différentes ont été observées durant cette saison hivernale de suivi. Suivant les carrés, le nombre d'espèces répertorié se situe entre 8 et 41, chiffres qui tiennent compte de la richesse des milieux représentés. Le facteur météo peut être un facteur réducteur dans la collecte de données en cas d'intempéries et de grands vents. Le facteur chasse est à prendre en considération sur certains de ces milieux et carrés de suivi, la pression et le dérangement qu'elle exerce dans certains secteurs pouvant impacter la présence des espèces observées notamment lorsque le relevé est réalisé le week-end.

Figure 2 – nombre d'espèces observées par carré



Le carré de Brunelles (280825) obtient le meilleur résultat quant au nombre d'oiseaux observées avec un total de 41 espèces différentes. Ce carré est situé dans le Perche et le milieu agricole présente une mixité de cultures et de prairies. Il reste encore quelques haies percheronnes agrémentant le paysage agricole même si le bocage a cédé la place de plus en plus aux terres cultivables.

Le carré qui suit juste derrière en nombre d'espèces est celui de Montboissier (281065) avec 36 espèces observées.

Quant à ceux qui cumule le plus grand nombre d'individus comptabilisé, il s'agit des carrée Neuvy en Beauce (280950) avec 14084 individus, le carré de Montboissier (281065) avec 1949 individus et le carré de Meslay le Grenet (281484) avec 1229 individus en raison de grosses troupes d'oiseaux hivernants : Vanneaux huppés, Pigeons ramiers, Pluviers dorés, étourneaux sansonnets par ordre d'importance.

Pour l'ensemble de ces carrés suivis durant l'hiver 2025/2026, en nombre de données, c'est la Corneille noire qui arrive en tête de liste, suivi par le Pigeon ramier, comme les années précédentes. Ces deux espèces occupent 100 % des carrés de suivi. Cette année, l'alouette des champs supplante le Pinson des arbres notamment quant au nombre d'individus observès (218 versus 192) grâce à 7

rassemblements dénombrés supérieurs à 10 individus, les plus importants étant ceux du 02 décembre 2025 à St Victor de Buthon avec 25 individus et du 06 décembre 2025 à Montboissier avec 35 individus.

Ci-dessous la liste des 25 premières espèces les plus fréquemment notées, tous carrés confondus.

Tableau 3 - Nb de données et d'individus observés par espèces

Espèces	nb données
Corneille noire	71
Pigeon ramier	65
Alouette des champs	47
Pinson des arbres	47
Merle noir	41
Étourneau sansonnet	36
Mésange charbonnière	33
Pipit farlouse	30
Rougegorge familier	28
Mésange bleue	27
Moineau domestique	24
Buse variable	22
Vanneau huppé	22
Faisan de Colchide	21
Grive litorne	13
Tourterelle turque	13
Pluvier doré	12
Geai des chênes	11
Grive draine	11
Troglodyte mignon	11
Faucon crécerelle	9
Pic épeiche	9
Grive mauvis	8
Grive musicienne	8
Pie bavarde	7

La Corneille noire a vu ses effectifs évoluer au fil de l'augmentation des participations à ce programme, le nombre d'observateurs et de carrés suivis ayant multiplié par presque deux et demi le nombre de données de cette espèce depuis le commencement de ce programme et elle apparaît, tout comme le pigeon ramier sur l'ensemble des carrés de suivi. Les résultats du Pigeon ramier sont à mettre en lien avec l'importance des troupes hivernantes qui se rajoutent aux sédentaires. La rigueur des vagues de froid qui succèdent aux périodes de douceur relative participent de manière aléatoire aux résultats concernant la présence et le nombre d'individus des espèces hivernantes grégaires tel que le Pigeon ramier, le Pluvier doré, le Vanneau huppé et l'étourneau sansonnet pour tous les carrés visités. Cette année l'observation du hibou des marais sur le carrée 280950 Neuvy en Beauce représente une donnée remarquable pour cette enquête.

Les résultats suivants concernant le Pinson des arbres, le merle noir et la mésange charbonnière reflètent les résultats collectés sur le reste du territoire. A l'échelle nationale*, ces trois espèces sont en effet celles qui sont les plus communes en ce qui concerne la fréquence d'observation sur les

carrés nationaux. Ce suivi SHOC étant encore trop récent dans notre département, il ne peut pas être établi à ce jour de tendances régionales sur les espèces hivernantes les plus communes.

** (source : SUIVI DES OISEAUX COMMUNS EN FRANCE Résultats 2025 des programmes participatifs de suivi des oiseaux communs – édition 2026 – LPO France)*

Annexe

Tableau 4 - Liste complètes des oiseaux observés sur chacun des carrés

280132 - Prudemanche	280214 - Les Châtelets	280622 - St Victor de Buthon	280753 - Meslay le Grenet	280825 - Brunelles	280950 - Neuvy en Beauce
Alouette des champs	Alouette des champs	Accenteur mouchet	Alouette des champs	Accenteur mouchet	Alouette des champs
Buse variable	Buse variable	Alouette des champs	Buse variable	Bergeronnette grise	Bergeronnette grise
Corneille noire	Corneille noire	Bruant jaune	Corbeau freux	Bruant jaune	Bruant des roseaux
Étourneau sansonnet	Étourneau sansonnet	Buse variable	Corneille noire	Bruant zizi	Buse variable
Faisan de Colchide	Faisan de Colchide	Corneille noire	Étourneau sansonnet	Buse variable	Corneille noire
Faucon crécerelle	Geai des chênes	Étourneau sansonnet	Faisan de Colchide	Canard colvert	Étourneau sansonnet
Grive draine	Grimpereau des jardins	Faisan de Colchide	Faucon crécerelle	Chardonneret élégant	Faisan de Colchide
Grive litorne	Linotte mélodieuse	Faucon crécerelle	Geai des chênes	Corneille noire	Faucon crécerelle
Grive mauvis	Merle noir	Geai des chênes	Grimpereau des jardins	Épervier d'Europe	Geai des chênes
Merle noir	Mésange à longue queue	Grive litorne	Grive draine	Étourneau sansonnet	Goéland argenté
Mésange bleue	Mésange bleue	Héron cendré	Linotte mélodieuse	Faisan de Colchide	Grimpereau des jardins
Mésange charbonnière	Mésange charbonnière	Merle noir	Merle noir	Faucon crécerelle	Grive draine
Moineau domestique	Mésange nonnette	Mésange bleue	Mésange bleue	Geai des chênes	Grive litorne
Pigeon ramier	Moineau domestique	Mésange charbonnière	Mésange charbonnière	Grand Cormoran	Héron cendré
Pinson des arbres	Pic épeiche	Moineau domestique	Moineau domestique	Grive draine	Hibou des marais
Pluvier doré	Pigeon biset domestique	Pie bavarde	Mouette rieuse	Grive litorne	Merle noir
Pouillot véloce	Pigeon ramier	Pigeon biset domestique	Pic vert	Grive mauvis	Mésange bleue
Rougegorge familier	Pinson des arbres	Pigeon ramier	Pigeon ramier	Grive musicienne	Mésange charbonnière
Tourterelle turque	Pipit farlouse	Pinson des arbres	Pinson des arbres	Grosbec casse-noyaux	Moineau domestique
Troglodyte mignon	Pluvier doré	Pinson du Nord	Pipit farlouse	Merle noir	Perdrix grise
Vanneau huppé	Roitelet huppé	Rougegorge familier	Pluvier doré	Mésange à longue queue	Pic épeiche
	Rougegorge familier	Tourterelle turque	Rougegorge familier	Mésange bleue	Pigeon ramier
	Sittelle torchepot	Vanneau huppé	Tarier pâtre	Mésange charbonnière	Pinson des arbres
	Tourterelle turque	Verdier d'Europe	Tourterelle turque	Moineau domestique	Pipit farlouse
	Troglodyte mignon		Troglodyte mignon	Pic épeiche	Pluvier doré
	Verdier d'Europe		Vanneau huppé	Pic vert	Rougegorge familier
				Pie bavarde	Tourterelle turque
				Pigeon colombin	Vanneau huppé
				Pigeon ramier	
				Pinson des arbres	
				Pinson du Nord	
				Pipit farlouse	
				Pluvier doré	
				Roitelet à triple bandeau	
				Roitelet huppé	
				Rougegorge familier	
				Tarin des aulnes	
				Tourterelle turque	
				Troglodyte mignon	
				Vanneau huppé	
				Verdier d'Europe	

281065 - Montboissier	281195 - Pré Saint Evroult	281484 - Charray
Accenteur mouchet	Busard Saint-Martin	Alouette des champs
Alouette des champs	Buse variable	Busard Saint-Martin
Bergeronnette grise	Corneille noire	Buse variable
Busard Saint-Martin	Étourneau sansonnet	Choucas des tours
Buse variable	Faisan de Colchide	Corneille noire
Chardonneret élégant	Pie bavarde	Étourneau sansonnet
Corbeau freux	Pigeon ramier	Faucon crécerelle
Corneille noire	Pinson des arbres	Grande Aigrette
Étourneau sansonnet		Grive draine
Faisan de Colchide		Grive litorne
Faucon crécerelle		Grive mauvis
Geai des chênes		Grive musicienne
Grive draine		Linotte mélodieuse
Grive litorne		Merle noir
Grive mauvis		Mésange bleue
Grive musicienne		Mésange charbonnière
Héron cendré		Pic épeiche
Linotte mélodieuse		Pie bavarde
Merle noir		Pigeon colombin
Mésange à longue queue		Pigeon ramier
Mésange bleue		Pinson des arbres
Mésange charbonnière		Pinson du Nord
Moineau domestique		Pipit farlouse
Pic épeiche		Rougegorge familier
Pic vert		Vanneau huppé
Pie bavarde		
Pigeon biset domestique		
Pigeon ramier		
Pinson des arbres		
Pinson du Nord		
Pipit farlouse		
Pluvier doré		
Rougegorge familier		
Tourterelle turque		
Troglodyte mignon		
Vanneau huppé		